

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-5-69 929758

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 4 au Bulletin du mois de Mai 1969

19 Mai 1969

Avertissement

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les risques de contamination sont toujours importants et les premières taches de Tavelures peuvent être observées actuellement dans les vergers négligés. D'autre part, la végétation s'est développée très rapidement au cours de ces derniers jours, laissant une surface foliaire importante sans protection. Ainsi, est-il conseillé d'effectuer un nouveau traitement fongicide dès réception de la présente note.

Information

OIDIUM

L'Oïdium s'est développé avec intensité dans certaines plantations de pommiers. Profiter de l'intervention contre la Tavelure pour ajouter un anti-Oïdium à la bouillie.

ARBUSTES A PETITS FRUITS

- FRAMBOISIERS -

DESSECHEMENT DES RAMEAUX

Renouveler la protection contre cette maladie.

BYTURUS ou VER DE LA FRAMBOISE

La présence de ce Coléoptère gris-brun est assez fréquente sur framboisiers et notamment dans les plantations de la région du TOULOIS.

Les populations actuelles de cet insecte risquent d'être à l'origine d'une forte infestation de "Vers" dans les fruits.

Nous recommandons d'exécuter un traitement insecticide dès à présent et avant la floraison avec une spécialité à base de D.D.T. ou de Parathion.

Une application complémentaire pourra éventuellement être réalisée pendant la floraison avec du Toxaphène ou de la Roténone.

.../...

31

OIDIUM

Les premières manifestations pourront apparaître prochainement sur les cépages les plus sensibles à cette maladie.

L'Oïdium étant très vulnérable au début de son développement, il est conseillé d'effectuer un premier traitement, de préférence en poudrage. Le Soufrage précoce présente l'avantage d'exiger peu de Soufre et d'être facile à exécuter.

Nous rappelons que les produits soufrés ont également une bonne action contre les acariens.

PYRALE DE LA VIGNE

Les premières chenilles de Pyrale ont été observées dans les parcelles habituellement contaminées et même dans certaines autres situations jusqu'ici épargnées, notamment dans la région de COLMAR.

Il est conseillé d'intervenir dès la reconnaissance des jeunes chenilles, en utilisant une spécialité à base de Mévinphos à 50 g de M.A./hl, ou de Parathion à 25 g de M.A./hl.

Avoir soin d'apporter une quantité de bouillie suffisante pour bien mouiller le feuillage.

GRANDE CULTURE- CEREALES -MOUCHE GRISE DU BLE

Beaucoup d'agriculteurs du KOCHERSBERG (67) se plaignent actuellement des dégâts causés dans les céréales d'hiver, par la Mouche grise du blé. Les parcelles atteintes présentent de larges taches où la céréale est dépérissante. L'observation directe des plants permet de constater la présence d'un asticot à l'intérieur des tiges.

A l'époque actuelle, il n'est pas possible de réaliser de traitement.

Nous rappelons que la seule méthode de lutte a un caractère préventif. Elle consiste à n'employer que des semences ayant reçu une protection appropriée. Traitement à sec effectué avec :

Lindane : 40 g + Endosulfan : 100 g de M.A.

Diéthion : 150 g de M.A.

Lindane : 80 g de M.A.

(Dose pour 1 quintal de semence).

Nous invitons donc les propriétaires des parcelles endommagées à prendre bonne note de cette information pour pouvoir, le moment venu, prendre toutes dispositions utiles.

TIPULES

Des attaques sérieuses de larves de Tipules sur céréales sont constatées dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans la région de SEICHEPREY.

Nous précisons qu'il est actuellement trop tard pour intervenir efficacement car les larves arrivent au terme de leur développement.

La lutte doit être entreprise très tôt, sur des larves jeunes et dès l'apparition des premiers dégâts.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

19 Mai 1969

V I G N E

CONCOURS POUR LA DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU

Le dépistage des premières taches de Mildiou de la vigne présente un intérêt certain. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements Agricoles organise cette année encore un concours pour la détection des foyers primaires de Mildiou.

Il sera procédé à la répartition des prix suivants :

- Pour chacun des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
 - 1 prix d'une valeur de 50.- F.
 - 2 prix d'une valeur de 30.- F.
- Pour chacun des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle :
 - 1 prix d'une valeur de 50.- F.
 - 1 prix d'une valeur de 30.- F.

L'envoi aura le maximum de chances d'arriver en parfait état si les feuilles sont enveloppées dans de la mousse ou du coton hydrophile légèrement humide et emballées dans un sachet en matière plastique.

Afin d'obtenir le maximum de précisions sur l'implantation de ces premiers foyers, nous vous proposons d'utiliser la fiche de renseignements ci-dessous.

(à détacher)

Nom et Prénoms :

Adresse :

Commune :

Lieu-dit :

Cépages :

Situation de la feuille malade sur la souche
(1ère, 2ème, 3ème, 4ème feuille, etc...) :

Nombre de taches observées dans la parcelle :

Situation de la parcelle : coteau - plaine :

Date de la découverte :

Signature

32